



**UEFA Grassroots 'C' edzőképzés**

---

# **DEVIANCIÁK AZ ISKOLÁBAN**

**Előadó:**

**Baranya István**  
**UEFA Pro,**  
**pszichológus**


# Társadalmi normák, normarendszer

## Működőképesség:

- normarendszerek irányítják.
- követnie kell bizonyos viselkedési szabályokat.

## A társadalomban sokféle norma érvényesül egymás mellett:

- jogi normák
- valláserkölcsi normák
- erkölcsi, etikai
- szokások, illemszabályok, divatszabályok



## Konform (normakövető) magatartás:

A társadalmi normáktól nem eltérő, az elfogadott viselkedési szabályokat betartó viselkedés.

# A deviáns viselkedés

---

*A deviancia:* szociológiai fogalom, eltérést jelent.

*A deviáns viselkedések:* olyan megnyilvánulások, amelyek közös jellemzője, hogy a társadalom által elfogadott szokásoktól, normáktól eltérnek.  
(*normaszegő viselkedés*)

# Deviancia típusai

- Öngyilkosság
- Bűnözés
- Alkoholizmus
- Dohányzás
- Kábítószer
- Pszichés és mentális betegségek
- Viselkedészavar

# FŐBB ÉLETKORI SZAKASZOK

Életkor	Év
Újszülöttkor	0-2 hónapig
Csecsemőkor	2 hónaptól - 1 évig
Kisgyermekkor	1-3 év
Óvodáskor	3-7 év
Kisiskoláskor	7-11 év
Prepubertáskor	11-13 év
Pubertáskor	13-17 év
Ifjúkor	17-21/24
Korai felnőttkor	24-30 év
Középső felnőttkor	30-45
Késői felnőttkor	45-60
Időskor	60-75
Aggkor	75-

## *Biológiai életkor*

**A gyermek biológiai érettsége – meghatározható.  
Ez az egyes életkorokban eltérő lehet**

**Az eltérés:** fejlettebb, kevésbé fejlettebb, retardált, akcelerált ... „létezhet”

## *Naptári életkor*

**A kronológiai kor. A valós életkor.**



UEFA Grassroots 'C' edzőképzés

# ISKOLÁK

---



# Deviancia típusai

- Öngyilkosság
- Bűnözés
- Alkoholizmus
- Dohányzás
- Kábítószer
- Pszichés és mentális betegségek
- Viselkedészavar



# ÖNGYILKOSSÁG (Magyarország)

- Négyóránként egy magyar lesz öngyilkos
- Évente 2500 magyar vet véget életének.
- A serdülők negyede foglalkozott már az öngyilkosság gondolatával.
- Nincs öngyilkos gén




# Az öngyilkosság rizikófaktorai

---

- pszichiátriai betegségek
- depresszió
- skizofrénia
- alkohol- és/vagy drogfüggőség
- megelőző öngyilkossági kísérlet a családban, a közeli környezetben
- az öngyilkosság vagy a halálvágy megelőző említése
- kora gyermekkori veszteségek (szülő halála, válás)
- izoláció (családi, iskolai, közösségi )


# Az öngyilkosság kontinensek szerinti megoszlása



# KORCSOPORTOK SZERINT

	<b>össz.</b>	<b>férfi</b>	<b>nő</b>
<b>9–19 éves</b>	57	44	13
<b>20–29 éves</b>	261	223	38
<b>30–39 éves</b>	440	375	65
<b>40–49 éves</b>	796	640	156
<b>50–59 éves</b>	589	475	114
<b>60–69 éves</b>	422	278	144
<b>70–79 éves</b>	441	283	158
<b>80 fölöttiek</b>	263	145	118

# AZ ELKÖVETÉS MÓDJA



## **Öngyilkosságot, acting out készséget befolyásoló tényezők:**

1. szocializáció (megküzdési technikák)
2. modellkövetés (serdülők, tinik utánzás)
  - volt a családban, környezetében öngyilkosság
  - az egyénnek volt megelőzően szuicid kísérlete
3. társadalmi okok
4. gyermek bántalmazás
5. szerelmi bánat
6. pszichés és szomatikus betegségek,  
amelyek kilátástalanság érzéssel járnak

# PSZICHOAKTÍV SZEREK

---

**Pszichoaktív szerek:** azok a természetes vagy mesterséges anyagok, amelyek az élő szervezetbe kerülve a **központi idegrendszerre hatva** megváltoztatják annak működését, funkcióját, illetve **hiányuk elvonási tünetekkel jár.**

A köznyelv gyakran a **kábítószerek, DROG** megnevezésére használja ezt a kifejezést.



Depresszánsok	Opiátok	Stimulánsok	Hallucigének	Cannabisok
<u>Kp.idegr.</u>	<u>Kp.idegr.</u>	Növelik az arousalt	Perceptuális élmény , érzéklet	Perceptuális élmény , érzéklet
<b>Nyugtatók</b> <b>Barbiturátok</b> (altatók) <b>Inhalátumok</b> (aerosol)	<b>Heroin</b> Alvás- ébranlét Nincs feszültség Elvonás rosszullét Injekcióval	<b>Anfetaminiok</b> Csökkent a fáradtság Testi-szellemi leépülés Injekció	<b>LSD</b> Szintelen, szagtalan Néhány nap múlva hat Misztikus élmény <b>24 órán belül kiürül</b>	<b>Hasis</b> Közel-kelet hallucináció
<b>Alkohol</b>		<b>Kokain</b> Coca növény Véna, szipó <b>2 nap alatt ürül</b>	<b>PCP</b> angyalpor Részagség halluináció	<b>Marihuána</b> Tér-idő torzulás <b>2 óra alatt a vizelettel ürül</b>





Normál szem



Fű, Marihuána, Hasis  
(vérrel telített  
hajszálerek)



Speed, LSD, Ecstasy, Kokain  
(tág pupilla)



Opiátok: heroin,  
codein, morfin ...  
(szűk pupilla)

# DOHÁNYZÁS


---

- 10 éves kora kipróbálta **fiúk 20%-a, lányok 15%-a**
- Fogékony a **fiúk 15%-a, lányok 28%-a!** (gondolja, hogy elkezdi)
- Dohányzó szülők gyermekei jóval magasabb arányban dohányoznak
- Hiedelmek: „Dohányzóknak több barátja van” „Dohányzó fiúk/lányok vonzóbbak”(1/5 így gondolja)
- Több dohányzást „támogató”, mint ellenző média üzenetet észlelnek



# DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS (HBSC)

## Rendszeresen dohányzók




- A nemi differenciák csökkennek
  - Kezdet: heti dohányzók 12,4 év napi dohányzók:12,2 év
- Naponta dohányzik**  
**11.oszt fiúk 33%**  
**lányok 27%**

**A fiúk között a sör, lányok között inkább a rövid italok a népszerűek**

**A fiúk 1/5 -e**

**A lányok 1/10 –e jelentős mennyiséget fogyaszt hetente**

## A többször volt részeg tanulók aránya



# RIZIKÓ MAGATARTÁS MEGHATÁROZÓI (INTERPRETÁCIÓ)

**Dohányzó szülők** **13%-al több dohányzó gyermek**


**Dohányzó barát** **4x annyian dohányoznak**

**Iskolai negatív viszonyulás** **5x annyian dohányoznak**  
**4x annyian voltak többször**  
**részegek**


**A szülői segítséget nélkülöző tanulók 2x annyian voltak már**  
**részegek**

**Társakkal együtt töltött esték száma szorosan korrellál a**  
**rizikómagatartással**





# FÜGGŐSÉGEK



# MIÉRT ISZNAK A FIATALOK ?

---

- kíváncsiság, hecc
- családból származó, szocializáció hiányában
- problémák elől való menekülésre és a harag
- frusztráció feldolgozására
- kortársi minta, utánzás
- felnőtttség jelképe, lázadás
- feldobottság igénye, a gátlások csökkentése
- szeretet és az éltető emberi kapcsolatok hiánya

# ENERGIAITALOK

## Hatások:

- **„ Gyors dopping” hatás:** felpörgés, élénkség, hangulatjavulás
- **Kitolja a fáradtságtűrés küszöbét**
- **Szívdobogás érzés, vérnyomás, pulzusszám emelkedés**
- **Hányinger, hányás**

## Utóhatások, rendszeres fogyasztás során kialakult hatások:

- **A felpörgés után depressziós tünetek:** pl. kedvetlenség, életuntság, apátia, síráskényszer, félelem
- **Vérnyomás hirtelen csökkenése, szédülés, álmosság**
- **Fizikai legyengülés a túlterhelés miatt és a valódi tápanyagbevitel híján**
- **Hasmenés**
- **Gyomorpanaszok, refluxbetegség**





# ITALOK ALKOHOL

## Az alkoholfogyasztás fokozatai

Kipróbálás

Rendszeres  
fogyasztás

Szenvedélyszerű  
fogyasztás

Vegyi függőség

# Disco balesetek







**AFTER PARTY után de. 11:00**  
**2005. február 12.**







Évente 30 fiatal,  
egy középiskolás osztálynyi  
veszti életét  
disco balesetben!




# VISELKEDÉSZAVAR

1.Elszökés otthonról

2.Szekták

3.Korai szexualitás

# Szexuális kapcsolatot már létesített 9-11. osztályos tanulók aránya



# SZUBKULTÚRÁK – DEVIÁNS VISELKEDÉS



**Discósok**



**Hippik**



# SZUBKULTÚRÁK – DEVIÁNS VISELKEDÉS



**Emós pár**



**Repper (deszkás breaker)**

# SZUBKULTÚRÁK – DEVIÁNS VISELKEDÉS



**Punkok**



**Rocker, metálos**

# SZUBKULTÚRÁK – DEVIÁNS VISELKEDÉS



**Dark, gót**



**Alteros, indie**

# PEDAGÓGUSOK LEHETŐSÉGEI

---

- ☐ Prevenció
  - ☐ Meggyőzés, ellenpropaganda
  - ☐ Közösségi nevelés
  - ☐ Szeretet
  - ☐ Család, önkormányzat, szakszolgálat  
egészségügy
  - ☐ Társadalmi összefogás
  - ☐ **Jog, törvények...???**
-





## UEFA Grassroots 'C' edzőképzés

---

# Köszönöm a figyelmet !